

化学療法スケジュール表

-
- 一般治療
-
-
- 臨床試験
-
-
- 治験

患者氏名

患者ID

生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

ICE (血液内科)

(登録No. 14HT03)

病名

推奨度

悪性リンパ腫

C

施用開始日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	／	／	／
VP-16 (100mg/m ²)		↓	↓	↓
IFM (1.67g/m ²)		↓	↓	↓
CBDC A (5×(G+25))			↓	
	Day	1	2	3
		(1サイクル 21 日)		(休薬 18 日以上)

1 パロセトロン点滴静注 ^{ハック} 0.75mg/50 デキサート注射液 1.65mg	50 mL 2 A	点滴注射 15分	(1)
2 生理食塩液 100mL デキサート注射液 1.65mg	100 mL 2 A	点滴注射 15分	(2) (3)
3 生理食塩液テルモ 500mL ベプシド注 100mg () mg (100mg/m ²)	500 mL	点滴注射 90分 0.4mg/mL以下の濃度になるように調製	(1) (2) (3)
4 生理食塩液テルモ 500mL イホマイド注射用 1g () g (1.67g/m ²)	500 mL	点滴注射 120分 カミテキサンと同時滴下	(1) (2) (3)
5 生理食塩液 100mL ウロミテキサン注 400mg () mg (557mg/m ²)	100 mL	点滴注射 30分 体イト [®] と同時滴下	(1) (2) (3)
6 ブドウ糖液 5% (500mL) カルボプラチン点滴静注液 () mg (5×(G+25))	500 mL	点滴注射 120分 CBDC A : MAX 800mg	(2)
7 ソルデム 3A 輸液 500mL	500 mL	点滴注射 120分	(1) (2) (3)
8 生理食塩液 100mL ウロミテキサン注 400mg () mg (557mg/m ²)	100 mL	点滴注射 30分 体イト [®] 投与4時間後	

(1) (2) (3)

9 生理食塩液 100 mL 100 mL 点滴注射
ウロミテキサン注 400 mg () mg (557 mg/m²) 体マイト[®] 投与8時間後

(1) (2) (3)

10 アプレピタントカプセル125mg 「N 1 c p 内服
点滴開始時 day1

11 アプレピタントカプセル80mg 「NK 1 c p 内服
朝食後 day2, 3