

化学療法スケジュール表

- 一般治療
 臨床試験
 治験

患者氏名

患者ID

生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²	医師	印
S c r	mg/dL		
C c r	ml/min		

Cmab + FP (1コース目)
(登録No. 140T04)

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 コース目・変更)

病名	推奨度
頭頸部癌	A

予定日付		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5-FU	(1000mg/m ²)	↓	↓	↓	↓						
Cmab	(400mg/m ²)	↓									
Cmab	(250mg/m ²)								↓	↓	
CDDP	(100mg/m ²)	↓									
Day	1	2	3	4	5	6	7	8	15		
	(1サイクル 21日)				(休薬 6日以上)						

最大6コース day2以降十分な輸液必要

1 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フルオロウラシルルートプライミング用	(1)
2 生理食塩液テルモ 500mL フルオロウラシル注	500 mL () mg (1000mg/m ²)	点滴注射 MAIN 24時間	(1) (2) (3) (4)
3 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フルオロウラシルブッシュ用	(4)
4 生理食塩液テルモ 500mL ホスアプロレピタント点滴静注用150mg 「NK	500 mL 1 瓶	点滴注射 90分	(1)
5 パロセトム点滴静注バッグ 0.75mg/50 デキサート注射液6.6mg デキサート注射液1.65mg ポララミン注5mg	50 mL 1 瓶 2 A 1 A	点滴注射 15分	
6 生理食塩液テルモ 250mL アービタックス注射液100mg () mg (400mg/m ²)	250 mL 120分 投与後1時間経過観察 total 250mL Cmabは初回のみ400mg/m ² 120分 2回目以降は、250mg/m ² 60分		(1)
7 生理食塩液 100mL デキサート注射液6.6mg	100 mL 1 瓶	点滴注射 15分	

ポララミン注 5 m g	1 A		(8) (15)
8 生理食塩液テルモ 250 mL アービタックス注射液 100 m g ()	250 mL m g (250m g /m ³)	点滴注射 60分 投与後 1 時間経過観察 total 250 mL	
9 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用 Cmab投与時と同じ速度で	(8) (15)
10 生理食塩液テルモ 500 mL 硫酸M g 補正液1mEq/mL 20 mL	500 mL 8 mL	点滴注射 90分	(1) (8) (15)
11 マンニットールS注射液 (300mL)	300 mL	点滴注射 60分	(1)
12 生理食塩液テルモ 500 mL シスプラチニン点滴静注 ()	500 mL m g (100m g /m ³)	点滴注射 120分 CDDPの輸液量はtotal 500mLとなるように生食を抜いて調製	(1)
13 生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 90分	(1)
14 生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 90分	(1)
15 生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 90分	(1)
16 生理食塩液 100 mL デキサート注射液 6. 6 m g	100 mL 1 瓶	点滴注射 15分	(2)
17 生理食塩液 100 mL デキサート注射液 6. 6 m g	100 mL 2 瓶	点滴注射 15分	(3)
18 生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 120分	(2) (3) (4) (5) (6) (7)
19 生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 120分	(2) (3) (4) (5) (6) (7)
20 生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 120分	(6) (7)
21 生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 120分	(6) (7)