

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

VRCAP
(登録No. 15HT01)

病名	推奨度
悪性リンパ腫	B

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/	/	/
Bortezomib (1.3mg/m ²)	↓				↓			↓ ↓
Rit-BS (375mg/m ²)	↓							
DXR (50mg/m ²)		↓						
CPA (750mg/m ²)			↓					
PSL (100mg)			↓	↓	↓	↓	↓	
Day	1	2	3	4	5	6	8	11
	(1サイクル 21日)			(休薬 10日以上)				

マンタル細胞リンパ腫 総コース数：6コース

1 ソルデム3A輸液 500mL	500 mL	点滴注射 ルートキープ 10時～	(1) (2)
2 生理食塩液 50mL ポララミン注5mg	50 mL 1 A	点滴注射 10時～ 全開 ベルケイド投与前	(1)
3 大塚生食注 (250mL袋)	250 mL	点滴注射 ルートキープ	(4) (8) (11)
4 ベルケイド注射用3mg 生理食塩液 20mL	() mg (1.3mg/m ²) 3 mL	静脈内注射 ベルケイド1Vあたり生食3mLで溶解 1mg/mLとして、必要量を計量	(1) (4) (8) (11)
5 生理食塩液テルモ 500mL リツキシマブBS点滴静注	500 mL () mg (375mg/m ²)	点滴注射 10時～ 初回 ~60分 25ml/hr 60~120分 100ml/hr 120分~ 200ml/hr 2コース目からは始め1時間 100ml/hr 以降200ml/hrも可	(1)
6 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)

7	グラセプトン点滴静注バッグ 1mg/50mL	1 袋	点滴注射 全開 側管 10時～	(2)
8	生理食塩液 100 mL ドキシリン塩酸塩注射液50mg 「サト」	100 mL () mg (50mg/m ²)	点滴注射 30分 側管 10時～10時30分 Total 100mLに調製	(2)
9	生理食塩液テルモ 500 mL エンドキサン注射用	500 mL () mg (750mg/m ²)	点滴注射 180分 側管 10時30分～13時30分	(2)
10	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用 側管	(2)
11	ソルデム3A輸液 500 mL メイロン静注8.4% 20 mL	500 mL 1 A	点滴注射 180分 補液追加あり	(1) (2)
12	アセトアミノフェン錠200mg 「マ	2 錠	内服 リツキシマブ投与30分前	
13	プレドニン錠 5 mg	(100) mg	内服 朝12錠 昼8錠 day2-6	