

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	印
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

R-CHEP
(登録No. 15HT02)

病名	推奨度
非ホジキンリンパ腫	B

施用開始日 年 月 日
(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/	/
Rit-BS (375mg/m ²)	↓						
DXR (50mg/m ²)		↓					
VP-16 (100mg/m ²)		↓					
CPA (750mg/m ²)		↓					
PSL (100mg)		↓	↓	↓	↓	↓	
Day	1	2	3	4	5	6	
	(1サイクル 21日)		(休薬 15日以上)				

総コース数：6コース

1 ソルデム3A輸液 500mL	500 mL	点滴注射 ルートキープ 10時～	(1)
2 生理食塩液 50mL ポララミン注5mg	50 mL 1 A	点滴注射 10時～ 全開	(1)
3 生理食塩液テルモ 500mL リツキシマブBS点滴静注 () mg (375mg/m ²)	500 mL	点滴注射 10時～ 初回 ~60分 25ml/hr 60~120分 100ml/hr 120分~ 200ml/hr 2コース目からは始め1時間 100ml/hr 以降200ml/hrも可	(1)
4 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
5 ソルデム3A輸液 500mL メイロン静注8.4% 20mL	500 mL 1 A	点滴注射 180分 補液追加あり	(1)
6 ソルデム3A輸液 500mL	500 mL	点滴注射 ルートキープ 10時～	(2)
7 グラネセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL	1 袋	点滴注射	

			全開 側管 10時～	(2)
8	生理食塩液 100 mL ドキシリジン塩酸塩注射液50mg 「サト」	100 mL () mg (50mg/m ²)	点滴注射 30分 側管 10時～10時30分	(2)
9	生理食塩液テルモ 500 mL ベプシド注 100 mg	500 mL () mg (100mg/m ²)	点滴注射 90分 側管 10時30分～12時	(2)
10	生理食塩液テルモ 500 mL エンドキサン注射用	500 mL () mg (750mg/m ²)	点滴注射 180分 側管 12時～15時	(2)
11	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用 側管	(2)
12	ゾルデム3A輸液 500 mL メイロン静注8.4% 20 mL	500 mL 1 A	点滴注射 180分 補液追加あり	(2)
13	アセトアミノフェン錠200mg 「マ	2 錠	内服 リツキシマブ [®] 投与30分前	
14	プレドニン錠 5 mg	(100) mg	内服 朝12錠 昼8錠 day2-6	