

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

BB-R
(登録No. 15HT03)

病名	推奨度
悪性リンパ腫	C

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/
Bortezomib (1.3mg/m ²)	↓	↓	↓	↓	↓
Rit-BS (375mg/m ²)	↓				
Bendamustine (90mg/m ²)	↓	↓			
	Day	1	4	8	11
(1サイクル 28 日) (休薬 17 日以上)					

1 生理食塩液テルモ 250 mL	250 mL	点滴注射 ルートキープ	(1) (4) (8) (11)
2 生理食塩液 50 mL ポララミン注 5 mg	50 mL 1 A	点滴注射 ベルケイド投与前 全開	(1)
3 ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 () mg (1.3mg/m ²) 生理食塩液 20 mL	3 mL	静脈内注射 ベルケイド 1Vあたり生食3mLで溶解 必要量をシリンジに計量	(1) (4) (8) (11)
4 生理食塩液テルモ 500 mL リツキシマブBS点滴静注 () mg (375mg/m ²)	500 mL	点滴注射 180分 初回 ~60分 25ml/hr 60~120分 100ml/hr 120分以降 200ml/hr 2コース目からは始め1時間 100ml/hr 以降200ml/hr	(1)
5 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
6 パロピト点静注バッグ 0.75mg/50 デキサート注射液 6.6 mg	50 mL 1 瓶	点滴注射 15分	(1)
7 生理食塩液 100 mL デキサート注射液 6.6 mg	100 mL 1 瓶	点滴注射 15分	(4)
8 生理食塩液 50 mL ベンダムスチン塩酸塩点滴静注 () mg (90mg/m ²)	50 mL	点滴注射 10分	

(1) (4)

9 生理食塩液 50 mL

50 mL

点滴注射
フラッシュ用

(1) (4)

10 アセトアミノフェン錠200mg 「マ

2 錠

内服
リツキシマブ投与30分前