

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

Her (2回目以降) + SOX
(登録No. 16GI02)

病名	推奨度
胃癌	C

施用開始日 年 月 日
(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1-OHP (130mg/m ²)	↓									
Trastuzumab (6mg/kg)	↓									
S-1 (80mg/m ²)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	予定日付	/	/	/	/					
S-1 (80mg/m ²)	↓	↓	↓	↓						
	Day	11	12	13	14					
(1サイクル 21日) (休薬 7日以上)										

1 パロリセトン点滴静注バッグ 0.75mg/50 デキサート注射液 6.6mg	50 mL 1 瓶	点滴注射 15分	(1)
2 ブドウ糖液 5% (250mL) オキサリプラチン点滴静注液 () mg (130mg/m ²)	250 mL () mg (130mg/m ²)	点滴注射 120分	(1)
3 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4 大塚生食注 (250mL袋) トラスツズマブBS点滴静注用 () mg (6mg/kg) 注射用水 20mL	250 mL () mg (6mg/kg) 20 mL	点滴注射 30分 60mg:注射用水3.0mLで溶解 150mg:注射用水7.2mLで溶解	(1)
5 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
6 エスワンタイホウ配合OD錠 () mg (80mg/m ²)	() mg (80mg/m ²)	内服 S-1の投与量は以下の通り 体表面積1.25m ² 未満→80mg/day 1.25m ² ~1.5m ² 未満→100mg/day 1.5m ² 以上→120mg/day	