

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

ハイカムチン/P T X + B m a b
(登録No. 16GY05)

病名	推奨度
子宮頸癌	A

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/
P T X (175mg/m ²)	↓			
N G T (0.75mg/m ²)	↓	↓	↓	
B m a b (15mg/kg)	↓			
	Day	1	2	3
(1サイクル 21 日) (休薬 18 日以上)				

1 生理食塩液 100 mL	100 mL	点滴注射	
デキサート注射液 6.6 mg	2 瓶	15分	
デキサート注射液 1.65 mg	2 A		
フェチゾン注射液20mg「トワ」	1 A		
ボララミン注 5 mg	1 A		(1)
2 生理食塩液 100 mL	100 mL	点滴注射	
		30分	(1)
3 ブドウ糖液 5% (500 mL)	500 mL	点滴注射	
パクリタキセル注 () mg (175mg/m ²)		180分	(1)
4 生理食塩液 100 mL	100 mL	点滴注射	
デキサート注射液 6.6 mg	1 瓶	15分	(2) (3)
5 生理食塩液 100 mL	100 mL	点滴注射	
ハイカムチン注射用 1.1 mg () mg (0.75mg/m ²)		30分	(1) (2) (3)
6 生理食塩液 100 mL	100 mL	点滴注射	
アバスチン点滴静注用 () mg (15mg/kg)		90分	
		初回投与忍容性良好なら	
		2回目投与は60分可	
		2回目投与忍容性良好なら	
		以降の投与は30分可	(1)
7 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射	
		フラッシュ用	(1) (2) (3)