

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

アフリベルプト+FOLFIRI (インフューザー-使用)
(登録No. 17GI04)

病名	推奨度
大腸癌	B

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	／
アフリベルプト (4mg/kg)		↓
1-LV (200mg/m ²)		↓
CPT-11 (180mg/m ²)		↓
5-FU (400mg/m ²)		↓
5-FU (2400mg/m ²)		↓
	Day 1	
(1サイクル 14日) (休薬 13日以上)		

1 パロロセトン点滴静注バッグ 0.75mg/50 デキサート注射液 6.6mg	50 mL 1 瓶	点滴注射 15分	(1)
2 生理食塩液 100 mL ザルトラップ点滴静注用 () mg (4mg/kg)	100 mL	点滴注射 60分 シュアプ ラグ ADセットのフィルター使用 (ホリエーテルスポン 0.2μm) 0.6~8mg/mLの濃度に調製	(1)
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4 大塚生食注 (250mL袋) レボホリナート点滴静注用 () mg (200mg/m ²)	250 mL	点滴注射 120分 イリノカンと同時滴下 側管	(1)
5 ブドウ糖液 5% (250 mL) イリノテカン塩酸塩点滴静注液 () mg (180mg/m ²)	250 mL	点滴注射 90分 レボホリナートと同時滴下	(1)
6 フルオロウラシル注 () mg (400mg/m ²) 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 全開 1-LV, CPT-11同時滴下終了後	(1)
7 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	

8 フルオロウラシル注
生理食塩液 50 mL

() mg (2400mg/ml)
50 mL

中心静脈注射・精密持続
インフューザー使用 46時間
生食希釈量早見表参照

(1)

(1)