

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

ERD (3コース目以降)
(登録No. 17HT02)

病名	推奨度
多発性骨髄腫	B

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Elotuzumab (10mg/kg)		↓									
LEN (25mg)		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
DEX (28mg)		↓									
DEX (40mg)								↓			
	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Elotuzumab (10mg/kg)						↓					
LEN (25mg)		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
DEX (28mg)						↓					
	Day	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	予定日付	/	/								
LEN (25mg)		↓									
DEX (40mg)			↓								
	Day	21	22								

(1サイクル 28日) (休薬 6日以上)

1	生理食塩液 100 mL	100 mL	点滴注射	
	デキサート注射液6. 6mg	1 瓶	15分	
	ファモチジン注射液20mg「トワ」	1 A		
	ポララミン注5mg	1 A		(1) (15)
2	生理食塩液 100 mL	100 mL	点滴注射	
			45分	(1) (15)
3	生理食塩液テルモ 250 mL	230 mL	点滴注射	
	エムプリシティ点滴静注用 () mg (10mg/kg)		投与速度 120mL/時	
	注射用水 20 mL	40 mL		(1) (15)
4	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射	
			フラッシュ用	(1) (15)
5	レブラミドカプセル5mg (25) mg		内服	
			ねる前	

6	レナデックス錠 4 m g	(28) m g	内服 朝食後 エムプリシティ投与の3時間前迄に内服
7	アセトアミノフェン錠200mg 「マ	2 錠	内服 エムプリシティ投与の30-90分前に内服
8	レナデックス錠 4 m g	(40) m g	内服 朝食後