

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名

患者ID

生年月日

| | | | |
|------|----------------|-----|---|
| 身長 | cm | 診療科 | |
| 体重 | kg | | |
| 体表面積 | m ² | | |
| Scr | mg/dL | 医師 | 印 |
| Ccr | ml/min | | |

G-B 1コース目

(登録No. 18HT12)

| 病名 | 推奨度 |
|-----------|-----|
| 非ホジキンリンパ腫 | B |

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------|---|---|---|---|----|
| | 予定日付 | / | / | / | / | / |
| Obinutuzumab (1000mg) | ↓ | | | | ↓ | ↓ |
| Bendamustine (90mg/m ²) | | | ↓ | ↓ | | |
| | Day | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 |
| (1サイクル 28 日) (休薬 13 日以上) | | | | | | |

CD20陽性濾胞性リンパ腫 6コース

| | | | |
|---|----------------------|--|------------|
| 1 生理食塩液 50 mL ポララミン注 5 mg | 50 mL 1 A | 点滴注射 全開 | (1) |
| 2 生理食塩液テルモ 250 mL ガザイバ点滴静注1000mg | 210 mL (1000) mg | 点滴注射 Total 250mLに調製 初回 ~30分 12ml/hr 以降、30分毎に12ml/hrずつ上げる 最大100ml/hrまで 2回目以降、開始~30分 25ml/hr 以降、30分毎に25ml/hrずつ上げる 最大100ml/hrまで 0.2または0.22μmの インラインフィルター使用 | (1)(8)(15) |
| 3 生理食塩液 50 mL | 50 mL | 点滴注射 フラッシュ用 | (1)(8)(15) |
| 4 パロセトン点滴静注バッグ 0.75mg/50 デキサート注射液 6.6 mg | 50 mL 1 瓶 | 点滴注射 15分 | (2) |
| 5 生理食塩液 100 mL デキサート注射液 6.6 mg | 100 mL 1 瓶 | 点滴注射 15分 | (3) |
| 6 生理食塩液 50 mL ベンダムスチ塩酸塩点滴静注液 () mg (90mg/m ²) | 50 mL | 点滴注射 10分 | (2)(3) |
| 7 生理食塩液 50 mL | 50 mL | 点滴注射 フラッシュ用 | |

8 アセトアミノフェン錠200mg 「マ

2 錠

内服
がサ^レハ^レ投与30分前