

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

ペムブロリスマブ + CBDCA / アブラキサン
(登録No. 18LU03)

病名	推奨度
非小細胞肺癌	B

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/
Pembrolizumab (200mg)	↓					
Na b - P T X (100mg/m ²)	↓			↓	↓	
CBDCA (6 × (G+25))	↓					
Day	1	2	3	8	15	
	(1サイクル 21 日)		(休薬 6 日以上)			

特定生物由来製品のため同意書、使用記録の保存必要 総コース数：4コース

1	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ用	(1)
2	生理食塩液 100 mL キイトルーダ点滴静注 (200) mg	100 mL 200) mg	点滴注射 30分 希釈後の濃度1-10mg/mLに調製 0.2-5 μ m のインラインフィルター使用	(1)
3	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4	パロピト点静注バッグ 0.75mg/50 デキサート注射液 1. 65 mg	50 mL 2 A	点滴注射 15分 側管	(1)
5	生理食塩液 100 mL デキサート注射液 6. 6 mg	100 mL 1 瓶	点滴注射 15分	(8) (15)
6	生理食塩液 100 mL アブラキサン点滴静注用 100 () mg (100mg/m ²)	100 mL () mg (100mg/m ²)	点滴注射 30分 1Vあたり生食20mLで溶解し必要量 を空にした生食容器に注入する フィルター不可 側管 (day1のみ)	(1) (8) (15)
7	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	

			側管 (day1のみ)	(1) (8) (15)
8	ブドウ糖液 5% (250 mL) カルボプラチン点滴静注液 () mg (6 × (G+25))	250 mL	点滴注射 60分 側管	(1)
9	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
10	アプレピタントカプセル125mg 「N	1 c p	内服 day1 点滴開始時	
11	アプレピタントカプセル80mg 「NK	1 c p	内服 day2, 3 朝食後	