

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

ペムブロリズマブ+CBDCA/Pem
(登録No. 18LU05)

病名	推奨度
非小細胞肺癌	B

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/
Pembrolizumab (200mg)	↓			
Pem (500mg/m ²)	↓			
CBDCA (5×(G+25))	↓			
	Day	1	2	3
(1サイクル 21 日) (休薬 18 日以上)				

扁平上皮癌を除く 総コース数：4コース

1 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ用	(1)
2 生理食塩液 100 mL キイトルーダ点滴静注	(200) mg	点滴注射 30分 希釈後の濃度1-10mg/mLに調製 0.2-5 μmのインラインフィルター使用	(1)
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4 パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50 デキサート注射液 1.65 mg	50 mL 2 A	点滴注射 15分	(1)
5 生理食塩液 100 mL ペムブロリズマブ点滴静注液「NK」	() mg (500mg/m ²)	点滴注射 10分	(1)
6 ブドウ糖液5% (250 mL) カルボプラチン点滴静注液	250 mL () mg (5×(G+25))	点滴注射 60分	(1)
7 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
8 アプレピタントカプセル125mg「N」	1 c p	内服 day1 点滴開始時	

9 アプレピタントカプセル80mg 「NK

1 c p

内服

day2,3 朝食後

パンピタン末

1g

内服 分1 朝食後 7日前より連日内服

メチコバル注射液500 μ g

2A

筋肉内注射 7日前より9週毎投与

*Pemによる皮疹が出現した場合、次コースより投与前日から投与翌日までデカドロン8mg/日
予防投与を行う