

# 化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名  
患者ID  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

**ペムブロリズマブ+Pem維持**  
(登録No. 18LU07)

病名	推奨度
非小細胞肺癌	B

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

予定日付 / Pembrolizumab (200mg) ↓ Pem (500mg/m <sup>2</sup> ) ↓ Day 1 (1サイクル 21日) (休薬 20日以上)
---

**扁平上皮癌を除く**

1 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ用	(1)
2 生理食塩液 100mL キイトルーダ点滴静注	100 mL (200) mg	点滴注射 30分 希釈後の濃度1-10mg/mLに調製 0.2-5μmのインラインフィルター使用	(1)
3 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4 生理食塩液 100mL デキサート注射液6.6mg	100 mL 1 瓶	点滴注射 15分	(1)
5 生理食塩液 100mL ペムブロリズマブ点滴静注「NK」	100 mL ( ) mg (500mg/m <sup>2</sup> )	点滴注射 10分	(1)
6 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
パンビタン末	1g	内服 分1 朝食後 7日前より連日内服	
メチコパール注射液500μg	2A	筋肉内注射 7日前より9週毎投与	
*Pemによる皮疹が出現した場合、次コースより投与前日から投与翌日までデカドロン8mg/日 予防投与を行う			