

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

RT+mFOLFOX (インフューザー使用)
(登録No. 19GI11)

病名	推奨度
食道癌	C

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	↓
1-LV (200mg/m ²)		↓
1-OHP (85mg/m ²)		↓
5-FU (400mg/m ²)		↓
5-FU (1600mg/m ²)		↓
	Day 1	
(1サイクル 14 日) (休薬 13 日以上)		

6コース (3コース放射線併用 計50Gy)

1 パロチロン点滴静注バッグ 0.75mg/50 デキサート注射液 6.6mg	50 mL 1 瓶	点滴注射 15分	(1)
2 大塚生食注 (250mL袋) レボホリナート点滴静注用 () mg (200mg/m ²)	250 mL	点滴注射 120分 オキサリプラチンと同時滴下 側管	(1)
3 ブドウ糖液 5% (250mL) オキサリプラチン点滴静注液 () mg (85mg/m ²)	250 mL	点滴注射 120分 レボホリナートと同時滴下	(1)
4 フルオロウラシル注 () mg (400mg/m ²) 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 全開 1-LV, L-OHP同時滴下終了後	(1)
5 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
6 フルオロウラシル注 () mg (1600mg/m ²) 生理食塩液 50mL	50 mL	中心静脈注射・精密持続 インフューザー使用 46時間 生食希釈量早見表参照	(1)