

# 化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名  
患者ID  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

**tw Her (2コース目以降) + weekly PTX**  
(登録No. 20GI04)

病名	推奨度
胃癌	C

施用開始日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

		予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/
PTX	(80mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Trastuzumab	(6mg/kg)				↓			↓		↓	
Day		1	8	15	22	29	36	43	57	64	71
		(1サイクル 84 日)				(休薬 13 日以上)					

1	生理食塩液 100 mL	100 mL	点滴注射	(1) (8) (15) (29) (36) (43) (57) (64) (71)
	デキサート注射液 6.6 mg	1 瓶	15分	
	デキサート注射液 1.65 mg	1 A		
	ファモチジン注射液20mg 「トーワ」	1 A		
	ポララミン注 5 mg	1 A		
2	生理食塩液 100 mL	100 mL	点滴注射 30分	(1) (8) (15) (29) (36) (43) (57) (64) (71)
3	ブドウ糖液 5% (250 mL)	250 mL	点滴注射	
	パクリタキセル注 ( ) mg (80mg/m <sup>2</sup> )		60分	(1) (8) (15) (29) (36) (43) (57) (64) (71)
4	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1) (8) (15) (29) (36) (43) (57) (64) (71)
5	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ	(22)
6	生理食塩液テルモ 250 mL	250 mL	点滴注射	
	トラスツマブBS点滴静注用 ( ) mg (6mg/kg)		30分	
	注射用水 20 mL	20 mL	2回目以降、4週間以上投与間隔が空いている場合は、 初回投与量(8mg/kg)で60分投与可 60mg:注射用水3.0mLで溶解 150mg:注射用水7.2mLで溶解	(22) (43) (64)
7	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1) (22) (43) (64)