

化学療法スケジュール表

-
- 一般治療
-
-
- 臨床試験
-
-
- 治験

患者氏名

患者ID

生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
CCR	ml/min		

nal-IRI/5-FU (インフューザ-使用)
 (登録No. 20GI06)

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

病名	推奨度
肺癌	B

	予定日付	／
nal-IRI (70mg/m ²)		↓
l-LV (200mg/m ²)		↓
5-FU (2400mg/m ²)		↓
	Day 1	
(1サイクル 14 日) (休薬 13 日以上)		

2nd line以降 UGT1A1欠合体、*6*28両ヘテロ合体ではオニバド 50mg/m²にて開始

1 パロピト点滴静注バッグ 0.75mg/50 デキサート注射液 6.6mg	50 mL 1 瓶	点滴注射 15分	(1)
2 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 側管 ルートキープ パル輸液セット使用	(1)
3 ブドウ糖液 5% (500 mL) オニバド点滴静注 43mg () mg (70mg/m ²)	500 mL	点滴注射 90分 フィルター不可 側管	(1)
4 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用 側管	(1)
5 大塚生食注 (250mL袋) レボホリナート点滴静注用 () mg (200mg/m ²)	250 mL	点滴注射 120分	(1)
6 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
7 フルオロウラシル注 () mg (2400mg/m ²) 生理食塩液 50 mL	50 mL	中心静脈注射・精密持続 インフューザ-使用 46時間 生食希釈量早見表参照	(1)

20GI06 <次ページ有>

受付日 年 月 日

