

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

JALSG ALL202-0 地固め②
(登録No. 20HT04)

病名	推奨度
急性リンパ性白血病	B

施用開始日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCR	(1.3m g/m ²)	↓									
MTX	(3000m g/m ²)	↓									
6-MP	(25m g/m ²)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VCR	(1.3m g/m ²)					↓					
MTX	(3000m g/m ²)					↓					
6-MP	(25m g/m ²)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	Day	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	予定日付	/									
6-MP	(25m g/m ²)	↓									
	Day	21									

(1サイクル 28 日) (休薬 7 日以上)

day1. 15: DIT (MTX: 15mg, DEX4mg)

1	パロセトロン点滴静注ハッグ® 0.75mg/50	50 mL	点滴注射 全開	(1) (15)
2	生理食塩液 100 mL オンコビン注射用 1 mg	100 mL () mg (1.3m g/m ²)	点滴注射 30分 MAX 2mg	(1) (15)
3	ブドウ糖液 5% (500 mL) メソトレキセート注射用	500 mL () mg (3000m g/m ²)	点滴注射 Total 500mLに調製 50歳以上は1.5g/m ² 24時間	(1) (15)
4	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1) (15)
5	生理食塩液 50 mL アイソボリン点滴静注用25mg	50 mL 25 mg	点滴注射 全開 MTX開始後 36時間後	(2) (16)

6 生理食塩液 50 mL アイソボリン点滴静注用25mg	50 mL 7.5 mg	点滴注射 6時間毎に7回	(3) (4) (17) (18)
7 ロイケリン散10%(100mg/g)	() mg (25mg/ml)	内服 寝る前 day1-21	