

# 化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名  
患者ID  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

**JALSG ALL202-0 維持**  
(登録No. 20HT06)

病名	推奨度
急性リンパ性白血病	B

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

VCR	(1.3mg/m <sup>2</sup> )	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/		
PSL	(60mg/m <sup>2</sup> )		↓	↓	↓	↓	↓					
MTX	(20mg/m <sup>2</sup> )		↓					↓				
6-MP	(60mg/m <sup>2</sup> )		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		
		Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MTX	(20mg/m <sup>2</sup> )	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6-MP	(60mg/m <sup>2</sup> )		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
		Day	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
MTX	(20mg/m <sup>2</sup> )	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6-MP	(60mg/m <sup>2</sup> )		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
		Day	21	22	23	24	25	26	27	28		

(1サイクル 28 日) (休薬 日以上)

1 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ	(1)
2 生理食塩液 100 mL オンコビン注射用 1 mg	500 mL ( ) mg (1.3mg/m <sup>2</sup> )	点滴注射 MAX 2mg	(1)
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1) (2) (3) (8) (15) (22)
4 プレドニン錠 5 mg	( ) mg (60mg/m <sup>2</sup> )	内服 朝食後 day1-5	
5 メソトレキセート錠 2.5 mg	( ) 錠 (8錠/m <sup>2</sup> )	内服 寝る前 day1. 8. 15. 22	
6 ロイケリン散10% (100mg/g)	( ) mg (60mg/m <sup>2</sup> )	内服 寝る前 day1-28	