

化学療法スケジュール表

-
- 一般治療
-
-
- 臨床試験
-
-
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

| | | | |
|------|----------------|-----|---|
| 身長 | cm | 診療科 | |
| 体重 | kg | | |
| 体表面積 | m ² | | |
| Scr | mg/dL | 医師 | 印 |
| Ccr | ml/min | | |

デュルバルマブ+CBDCA/VP-16

(登録No. 20LU04)

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

| 病名 | 推奨度 |
|-------|-----|
| 小細胞肺癌 | B |

| | 予定日付 | / | / | / |
|-------------------------------|------|---|---|---|
| Durvalmab (1500mg) | ↓ | | | |
| CBDCA (6×(G+25)) | ↓ | | | |
| VP-16 (100mg/m ²) | ↓ | ↓ | ↓ | |
| | Day | 1 | 2 | 3 |
| (1サイクル 21 日) (休薬 18 日以上) | | | | |

4コース

| | | | |
|---|---------------|--|-----------|
| 1 生理食塩液 50 mL | 50 mL | 点滴注射 ルートキープ | (1) |
| 2 生理食塩液 100 mL イミフィンジ点滴静注 (1500) mg | 100 mL | 点滴注射 60分 0.2~0.22 μmのインラインフィルター使用 体重30kg以下は20mg/kgで投与 | (1) |
| 3 生理食塩液 50 mL | 50 mL | 点滴注射 フラッシュ用 | (1) |
| 4 パロセトン点滴静注バッグ0.75mg/50 デキサート注射液1.65 mg | 50 mL 2 A | 点滴注射 15分 | (1) |
| 5 生理食塩液 100 mL デキサート注射液1.65 mg | 100 mL 2 A | 点滴注射 15分 | (2)(3) |
| 6 ブドウ糖液5% (250 mL) カルボプラチン点滴静注液 () mg (6×(G+25)) | 250 mL | 点滴注射 60分 AUC: 5-6 | (1) |
| 7 生理食塩液テルモ 500 mL ベプシド注100 mg () mg (100mg/m ²) | 500 mL | 点滴注射 90分 VP-16: 80-100mg/m ² | (1)(2)(3) |
| 8 生理食塩液 50 mL | 50 mL | 点滴注射 フラッシュ用 | |

- | | | |
|------------------------|-------|-------------------|
| 9 アプレピタントカプセル125mg 「N | 1 c p | 内服 day1 点滴開始時 |
| 10 アプレピタントカプセル80mg 「NK | 1 c p | 内服 day2, 3 朝食後 |