

化学療法スケジュール表

-
- 一般治療
-
-
- 臨床試験
-
-
- 治験

患者氏名

患者ID

生年月日

| | | | |
|------|----------------|-----|---|
| 身長 | cm | 診療科 | |
| 体重 | kg | | |
| 体表面積 | m ² | | |
| Scr | mg/dL | 医師 | 印 |
| Ccr | ml/min | | |

ペムブロリズマブ + FP (80-800)
 (登録No. 21GI02)

| 病名 | 推奨度 |
|-----|-----|
| 食道癌 | B |

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

| | 予定日付 | / | / | / | / | / |
|------------------------------|------|--------------|---|-------------|---|---|
| 5-FU (800mg/m ²) | | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| Pembrolizumab (200mg) | | ↓ | | | | |
| CDDP (80mg/m ²) | | ↓ | | | | |
| Day | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | (1サイクル 21 日) | | (休薬 16 日以上) | | |

総コース数：6コース day2以降十分な輸液必要

| | | | |
|--|--------|---|---------------------|
| 1 生理食塩液 50 mL | 50 mL | 点滴注射 60分 メイン フルオウラシルルートプライミング用 | (1) |
| 2 生理食塩液テルモ 500 mL フルオウラシル注 () mg (800mg/m ²) | 500 mL | 点滴注射 メイン 24時間 | (1) (2) (3) (4) (5) |
| 3 生理食塩液 50 mL | 50 mL | 点滴注射 メイン フルオウラシルフラッシュ用 | (5) |
| 4 生理食塩液 50 mL | 50 mL | 点滴注射 ルートキープ 全開 側管 | (1) |
| 5 生理食塩液 100 mL キイトルーダ点滴静注 (200) mg | 100 mL | 点滴注射 30分 側管 希釈後の最終濃度は、 1~10mg/mLとなるように調製 0.2~0.22 μmのインラインフィルターを使用 | (1) |
| 6 生理食塩液 50 mL | 50 mL | 点滴注射 フラッシュ用 側管 | |

| | | | | |
|----|---|---|--|-----------------|
| 7 | 生理食塩液テルモ 500 mL ホスアプレタ点滴静注用150mg「NK | 500 mL 1 瓶 | 点滴注射 90分 側管 | (1) |
| 8 | パロセトン点滴静注バッグ ^{0.75mg/50} デキサート注射液6. 6 mg デキサート注射液1. 6 5 mg | 50 mL 1 瓶 2 A | 点滴注射 15分 側管 | (1) |
| 9 | 生理食塩液テルモ 500 mL 硫酸Mg 補正液1mEq/mL 20 mL | 500 mL 8 mL | 点滴注射 90分 側管 | (1) |
| 10 | マンニトールS注射液 (300mL) | 300 mL | 点滴注射 60分 側管 | (1) |
| 11 | 生理食塩液テルモ 500 mL シスプラチン点滴静注 () mg (80mg/m ²) | 500 mL () mg (80mg/m ²) | 点滴注射 120分 側管 CDDPの輸液量はtotal 500mlと なるように生食を抜いて調製 | (1) |
| 12 | 生理食塩液テルモ 500 mL | 500 mL | 点滴注射 90分 側管 | (1) |
| 13 | 生理食塩液テルモ 500 mL | 500 mL | 点滴注射 90分 側管 | (1) |
| 14 | 生理食塩液テルモ 500 mL | 500 mL | 点滴注射 90分 側管 | (1) |
| 15 | 生理食塩液 100 mL デキサート注射液6. 6 mg | 100 mL 1 瓶 | 点滴注射 15分 | (2) |
| 16 | 生理食塩液 100 mL デキサート注射液6. 6 mg | 100 mL 2 瓶 | 点滴注射 15分 | (3) |
| 17 | 生理食塩液テルモ 500 mL | 500 mL | 点滴注射 120分 | (2) (3) (4) (5) |
| 18 | 生理食塩液テルモ 500 mL | 500 mL | 点滴注射 120分 | (2) (3) (4) (5) |
| 19 | 生理食塩液テルモ 500 mL | 500 mL | 点滴注射 120分 | (2) (3) (4) (5) |
| 20 | 生理食塩液テルモ 500 mL | 500 mL | 点滴注射 | |

120分

(2) (3) (4) (5)