

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

ニボルマブ + CapOX
(登録No. 21GI04)

病名	推奨度
胃癌	B

施用開始日 年 月 日
(初回・継続 _____ コース目・変更)

Nivolumab (360mg)	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1-OHP (130mg/m ²)		↓									
Capec (2000mg/m ²)		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Capec (2000mg/m ²)	予定日付	/	/	/	/						
		↓	↓	↓	↓						
	Day	11	12	13	14						

(1サイクル 21日) (休薬 7日以上)

1 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ 全開	(1)
2 生理食塩液 100 mL オプジーボ点滴静注 (360) mg	100 mL (360) mg	点滴注射 30分 0.2または0.22 μmの インラインフィルターを使用	(1)
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4 パロセトン点滴静注バッグ0.75mg/50 デキサート注射液6.6 mg	50 mL 1 瓶	点滴注射 15分	(1)
5 ブドウ糖液5% (250 mL) オキサリプラチン点滴静注液 () mg (130mg/m ²)	250 mL () mg (130mg/m ²)	点滴注射 120分	(1)
6 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
7 カペシタビン錠300mg「ヤクルト () mg (2000mg/m ²)	() mg (2000mg/m ²)	内服 朝夕食後 カペシタビンの投与量は以下の通り 1.36m ² 未満：1200mg/回	

1. 36㎡以上1.66㎡未満 : 1500mg/回
1. 66㎡以上1.96㎡未満 : 1800mg/回
1. 96㎡以上 : 2100mg/回