

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
S c r	mg/dL	医師	印
C c r	ml/min		

IsaPd (2コース目以降)
(登録No. 21HT02)

病名	推奨度
多発性骨髄腫	B

施用開始日 年 月 日
(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Isatuximab (10m g/kg)		↓									
Pomalidomide (4m g)		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
DEX (40m g)								↓			
	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Isatuximab (10m g/kg)						↓					
Pomalidomide (4m g)		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	Day	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	予定日付	/	/								
Pomalidomide (4m g)		↓									
DEX (40m g)			↓								
	Day	21	22								

(1サイクル 28 日) (休薬 6 日以上)

1 アセリオ静注液1000mgバッグ	1 袋	点滴注射 15分	(1) (15)
2 生理食塩液 100 mL デキサート注射液6. 6mg ポララミン注5mg ファモチジン注射液20mg「トーワ」	100 mL 6 瓶 1 A 1 A	点滴注射 15分 75歳以上はDEXを20mgに減量	(1) (15)
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射	(1) (15)
4 生理食塩液テルモ 250 mL サークリサ点滴静注 () mg (10m g/kg)	250 mL	点滴注射 Total 250mLに調製 0. 2-0. 22 μ mのインラインフィルター使用 2回目以降0-60分：50mL/h 60-90分：80mL/h 90分以降：110mL/h	(1) (15)
5 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1) (15)

6	ボマリストカプセル4mg	(4) m g	内服 1日1回 day1-21
7	レナデックス錠 4 m g	(40) m g	内服 朝食後 day8, 22 75歳以上はD E Xを20m g に減量