

# 化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名  
患者ID  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

**DA-EPOCH-R**  
(登録No. 21HT05)

病名	推奨度
バーキットリンパ腫	B

施用開始日 年 月 日  
(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/
PSL (60mg/m <sup>2</sup> )		↓	↓	↓	↓	↓
Rit-BS (375mg/m <sup>2</sup> )		↓				
VP-16 (50mg/m <sup>2</sup> )		↓	↓	↓	↓	
VCR (0.4mg/m <sup>2</sup> )		↓	↓	↓	↓	
DXR (10mg/m <sup>2</sup> )		↓	↓	↓	↓	
CPA (750mg/m <sup>2</sup> )						↓
PSL (60mg/m <sup>2</sup> )		↓	↓	↓	↓	↓
	Day	1	2	3	4	5

(1サイクル 21日) (休薬 16日以上)

総コース : 6-8コース、day6~G-CSF投与

1 グラセトン点滴静注バッグ 1mg/50mL	1 袋	点滴注射 全開 リツキシマブ投与後のフラッシュまで パルピん針セット二股タイプ使用 (1)(2)(3)(4)(5)
2 生理食塩液 50mL プレドニン (水溶性) 20mg ( ) mg (60mg/m <sup>2</sup> )	50 mL	点滴注射 30分 朝 (1)(2)(3)(4)(5)
3 生理食塩液 50mL ポララミン注 5mg	50 mL 1 A	点滴注射 全開 (1)
4 生理食塩液テルモ 500mL リツキシマブBS点滴静注 ( ) mg (375mg/m <sup>2</sup> )	500 mL	点滴注射 180分 10時~ 初回 ~60分 25ml/hr 60~120分 100ml/hr 120分以降 200ml/hr 2コース目からは始め1時間 100ml/hr 以降200ml/hrも可 (1)
5 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用

(1)

6 生理食塩液 50 mL 50 mL

点滴注射  
精密持続投与前 ルートプライミング用

(1)

7 生理食塩液テルモ 500 mL 500 mL  
ベプシド注 100 mg ( ) mg (50 mg/m<sup>2</sup>)  
オンコビン注射用 1 mg ( ) mg (0.4 mg/m<sup>2</sup>)  
トキビルシ塩酸塩注射液50mg 「サト」 ( ) mg (10 mg/m<sup>2</sup>)

中心静脈注射・精密持続  
24時間  
VP-16:0.4mg/ml以下になるよう調製  
4日間 total 96時間精密持続注射  
VP-16, VCR, DXRの3剤を生食に混合  
前コースにおける好中球の最低値が  
500/ $\mu$ L以上の時、次コースから  
VP-16, DXRの投与量を20%増量  
前コースにおける好中球の最低値が  
500/ $\mu$ L未満の時、原則的に  
次コースも同じ投与量とする

(1) (2) (3) (4)

8 生理食塩液 50 mL 50 mL

点滴注射  
フラッシュ用

(4)

9 生理食塩液テルモ 250 mL 250 mL  
エンドキサン注射用 ( ) mg (750 mg/m<sup>2</sup>)

点滴注射  
120分  
96時間持続投与終了後、  
同じルートで点滴  
前コースにおける好中球の最低値が  
500/ $\mu$ L以上の時、  
次コースからCPAの投与量を  
20%増量する  
前コースにおける好中球の最低値が  
500/ $\mu$ L未満の時、  
原則的に次コースも同じ投与量

(5)

Drugs	Drug Doses per Dose Levels							
	-2	-1	1	2	3	4	5	6
Doxorubicin (mg/m <sup>2</sup> /day)	10	10	10	12	14.4	17.3	20.7	24.8
Etoposide (mg/m <sup>2</sup> /day)	50	50	50	60	72	86.4	103.7	124.4
Cyclophosphamide (mg/m <sup>2</sup> /day)	480	600	750	900	1080	1296	1555	1866

10 生理食塩液 50 mL 50 mL

点滴注射  
フラッシュ用

(5)

11 生理食塩液 50 mL 50 mL  
プレドニン (水溶性) 20 mg ( ) mg (60 mg/m<sup>2</sup>)

点滴注射  
30分  
夕

(1) (2) (3) (4) (5)

12 ソルデム3A輸液 500 mL 500 mL  
メイロン静注8.4% 20 mL 1 A

点滴注射  
180分  
補液追加あり

(1) (2) (3) (4) (5)

13 アセトアミノフェン錠200mg 「マ」 2 錠

内服  
リツシマブ 投与30分前