

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

Pola-BR (2コース目以降)
(登録No. 21HT07)

病名	推奨度
悪性リンパ腫	B

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	/	/
Rit-BS (375mg/m ²)	↓		
Pola (1.8mg/kg)	↓		
Bendamustine (90mg/m ²)	↓	↓	
	Day	1	2
(1サイクル 21日) (休薬 19日以上)			

DLBCL、総コース：6コース

1 生理食塩液 50mL ポララミン注5mg	50 mL 1 A	点滴注射 全開	(1)
2 生理食塩液テルモ 500mL リツキシマブBS点滴静注 () mg (375mg/m ²)	500 mL	点滴注射 180分 2コース目からは始め1時間 100ml/hr 以降200ml/hr	(1)
3 生理食塩液 100mL	100 mL	点滴注射 30分	(1)
4 生理食塩液 100mL ポライビー点滴静注 () mg (1.8mg/kg) 注射用水 20ml	100 mL 20 mL	点滴注射 30分 30mg製剤は注射用水1.8mLで溶解 140mg製剤は注射用水7.2mLで溶解 20mg/mLの濃度として必要量を調製 0.2又は0.22μmの インラインフィルターを通して投与 忍容性良好であれば2回目以降の 投与時間は30分まで短縮可	(1)
5 生理食塩液 100mL	100 mL	点滴注射 30分	(1)
6 パロセトロン点滴静注バッグ®0.75mg/50 デキサート注射液6.6mg	50 mL 1 瓶	点滴注射 15分	(1)

7	生理食塩液 100 mL デキサート注射液 6.6 mg	100 mL 1 瓶	点滴注射 15分	(2)
8	生理食塩液 50 mL ベンダムスル塩酸塩点滴静注液 () mg (90mg/m ²)	50 mL	点滴注射 10分	(1)(2)
9	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)(2)
10	アセトアミノフェン錠200mg 「マ	2 錠	内服 リツシマブ 投与30分前	