

# 化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名  
患者ID  
生年月日

|      |                |     |   |
|------|----------------|-----|---|
| 身長   | cm             | 診療科 |   |
| 体重   | kg             |     |   |
| 体表面積 | m <sup>2</sup> |     |   |
| Scr  | mg/dL          | 医師  | 印 |
| Ccr  | ml/min         |     |   |

**DBD (皮下注) (1-3コース目)**  
(登録No. 21HT11)

|        |     |
|--------|-----|
| 病名     | 推奨度 |
| 多発性骨髄腫 | B   |

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

|                                    | 予定日付 | / | / | / | / | / | /  | /  | /  | / |
|------------------------------------|------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|
| daratumumab (1瓶)                   | ↓    |   |   |   |   | ↓ |    |    |    | ↓ |
| Bortezomib (1.3mg/m <sup>2</sup> ) | ↓    |   | ↓ |   | ↓ |   | ↓  |    | ↓  |   |
| DEX (20mg)                         | ↓    | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓  | ↓  | ↓  |   |
| Day                                | 1    | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 |   |
| (1サイクル 21 日) (休薬 6 日以上)            |      |   |   |   |   |   |    |    |    |   |

**ボルテゾミブ 皮下注へ変更可**

|   |   |   |                                   |
|---|---|---|-----------------------------------|
| 1 | ダラキューロ配合皮下注 ( 1) 瓶  | 点滴注射<br>5分<br>1V全量(過量充填分を含め約16mL)<br>をシリンジに充填<br>シリンジポンプで180mL/hrで投与<br>22-25Gの翼状針を使用すること | (1) (8) (15)                      |
| 2 | 生理食塩液テルモ 250 mL 250 mL  | 点滴注射<br>60分<br>ルートキープ   | (1) (4) (8) (11)                  |
| 3 | ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 ( ) mg (1.3mg/m <sup>2</sup> )<br>生理食塩液 20 mL 3 mL | ワンショット末梢メイン側管<br>側管から   | (1) (4) (8) (11)                  |
| 4 | アセトアミノフェン錠500mg「マ<br>ルパフィン錠10mg                                       | 2錠<br>1錠  | 内服<br>ダラキューロ開始1時間前<br>day1. 8. 15 |
| 5 | レナデックス錠4mg ( 20) mg   | 内服<br>朝食後<br>day1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12  |                                   |