

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

ペムブロリズマブ+PTX/CBDCA (登録No. 22BR01)

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

病名	推奨度
乳癌	B

	予定日付	/	/	/
Pembrolizumab (200mg)	↓			
PTX (80mg/m ²)	↓	↓	↓	
CBDCA (5×(6+25))	↓			
Day	1	8	15	
	(1サイクル 21 日)		(休薬 6 日以上)	

TNBC : 術前4コース

1 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ	(1)
2 生理食塩液 100 mL キイトルーダ点滴静注 (200) mg	100 mL	点滴注射 30分 希釈後の最終濃度は1~10mg/mLとなるように調製 0.2から5μmのインラインフィルターを使用	(1)
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4 生理食塩液 100 mL デキサート注射液6. 6 mg 1 瓶 デキサート注射液1. 6 5 mg 1 A ファモチジン注射液20mg 「トワ」 1 A ポララミン注5 mg 1 A	100 mL	点滴注射 15分	(1) (8) (15)
5 パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50	50 mL	点滴注射 30分	(1)
6 生理食塩液 100 mL	100 mL	点滴注射 30分	(8) (15)
7 ブドウ糖液5% (250 mL) パクリタキセル注 () mg (80mg/m ²)	250 mL	点滴注射 60分	(1) (8) (15)

8	ブドウ糖液 5% (250 mL) カルボプラチン点滴静注液	(250 mL) mg $(5 \times (G+25))$	点滴注射 60分	(1)
9	生理食塩液 50 mL		50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1) (8) (15)