

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

| | | | |
|------|----------------|-----|---|
| 身長 | cm | 診療科 | |
| 体重 | kg | | |
| 体表面積 | m ² | | |
| Scr | mg/dL | 医師 | 印 |
| Ccr | ml/min | | |

リツキサン【算定不可】
(登録No. 22C010)

| 病名 | |
|-------------------|----------|
| 顕微鏡的多発血管炎 B | 全身性強皮症 B |
| 多発血管炎性肉芽腫 B | ループス腎炎 B |
| ネフローゼ症候群 B | |
| 慢性特発性血小板減少性紫斑病 B | |
| 後天性血栓性血小板減少性紫斑病 B | |

施用開始日 年 月 日
(初回・継続 _____ コース目・変更)

| | | |
|-----|-------------------------|--|
| Rit | (375mg/m ²) | 予定日付 / ↓ Day 1 (1サイクル 7日) (休薬 6日以上) |
|-----|-------------------------|--|

外来化学療法診療料 算定不可

| | | | |
|-------------------------------|--|--|-----|
| 1 生理食塩液 50mL ポララミン注5mg | 50 mL 1 A | 点滴注射 全開 | (1) |
| 2 生理食塩液テルモ 500mL リツキサン点滴静注 | 500 mL () mg (375mg/m ²) | 点滴注射 180分 初回 ~60分 25ml/hr 60~120分 100ml/hr 120分以降 200ml/hr 2コース目からは始め1時間 100ml/hr 以降200ml/hr | (1) |
| 3 生理食塩液 50mL | 50 mL | 点滴注射 フラッシュ用 | (1) |
| 4 アセトアミノフェン錠200mg 「マ | 2 錠 | 内服 リツキサン投与30分前 | |