

化学療法スケジュール表

-
- 一般治療
-
-
- 臨床試験
-
-
- 治験

患者氏名

患者ID

生年月日

| | | | |
|------|----------------|-----|---|
| 身長 | cm | 診療科 | |
| 体重 | kg | | |
| 体表面積 | m ² | | |
| Scr | mg/dL | 医師 | 印 |
| Ccr | ml/min | | |

ペムブロリズマブ+婦人科TC

(登録No. 22GY02)

病名

推奨度

子宮頸癌

B

施用開始日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

| | | |
|--------------------------|-------------------------|---|
| | 予定日付 | / |
| Pembrolizumab | (200mg) | ↓ |
| PTX | (175mg/m ²) | ↓ |
| CBDC A | (5×(G+25)) | ↓ |
| | Day | 1 |
| (1サイクル 21 日) (休薬 20 日以上) | | |

総コース数：6-9コース

| | | | | |
|---|---|------------------------------------|---|-----|
| 1 | 生理食塩液 50 mL | 50 mL | 点滴注射 ルートキープ | (1) |
| 2 | 生理食塩液 100 mL キイトルーダ点滴静注 | (200) mg | 点滴注射 30分 希釈後の最終濃度は1~10mg/mLと なるように調製 0.2から5μmのインラインフィルターを使用 | (1) |
| 3 | 生理食塩液 50 mL | 50 mL | 点滴注射 フラッシュ用 | (1) |
| 4 | 生理食塩液 100 mL デキサート注射液 6.6 mg デキサート注射液 1.65 mg ファモチジン注射液20mg「トワ」 ポララミン注 5 mg | 100 mL 2 瓶 2 A 1 A 1 A | 点滴注射 15分 | (1) |
| 5 | パロセトン点滴静注バッグ 0.75mg/50 | 50 mL | 点滴注射 30分 | (1) |
| 6 | ブドウ糖液 5% (500 mL) パクリタキセル注 | () mg (175mg/m ²) | 点滴注射 180分 | (1) |
| 7 | ブドウ糖液 5% (250 mL) カルボプラチン点滴静注液 | () mg (5×(G+25)) | 点滴注射 60分 | (1) |

22GY02 <次ページ有>

受付日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

| | | | | |
|----|---------------------|-------|-------------------|-----|
| 8 | 生理食塩液 50 mL | 50 mL | 点滴注射 フラッシュ用 | (1) |
| 9 | アプレピタントカプセル125mg 「N | 1 c p | 内服 day1 点滴開始時 | |
| 10 | アプレピタントカプセル80mg 「NK | 1 c p | 内服 day2.3 朝食後 | |
| 11 | デカドロン錠0.5 mg | 4 mg | 内服 day2.3 朝昼食後 | |