

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

| | | | |
|------|----------------|-----|---|
| 身長 | cm | 診療科 | |
| 体重 | kg | | |
| 体表面積 | m ² | | |
| Scr | mg/dL | 医師 | 印 |
| Ccr | ml/min | | |

エンハーツ(乳、肺)
(登録No. 23C007)

| 病名 | 推奨度 |
|--------|-----|
| 乳癌 | C |
| 非小細胞肺癌 | C |

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

| | | |
|---------|------------|--|
| DS-8201 | (5.4mg/kg) | 予定日付 / ↓ Day 1 (1サイクル 21 日) (休薬 20 日以上) |
|---------|------------|--|

| | | | | |
|---|--|--------------------------------------|---|-----|
| 1 | パロセトン点滴静注バッグ 0.75mg/50 デキサート注射液 6.6mg | 50 mL 1 瓶 | 点滴注射 15分 | (1) |
| 2 | ブドウ糖注射液 5% 50mL | 50 mL | 点滴注射 フラッシュ用 | (1) |
| 3 | ブドウ糖液 5% 100mL エンハーツ点滴静注用100mg 注射用水 20mL | 100 mL () mg (5.4mg/kg) 20 mL | 点滴注射 90分 初回忍容性良好であれば 2回目以降 30分まで短縮可 0.2μmインラインフィルター要 1Vを注射用水5mLで溶解 20mg/mLの濃度で必要量秤量 | (1) |
| 4 | ブドウ糖注射液 5% 50mL | 50 mL | 点滴注射 フラッシュ用 | (1) |