

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

tw Her (初回) + mFOLFOX6 (インフューザ[®]-使用)
(登録No. 23GI02)

病名	推奨度
胃癌	C

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/
1-LV (200mg/m ²)		↓	↓		↓
1-OHP (85mg/m ²)		↓	↓		↓
5-FU (400mg/m ²)		↓	↓		↓
Trastuzumab (8mg/kg)		↓			
5-FU (2400mg/m ²)		↓	↓		↓
Trastuzumab (6mg/kg)				↓	
Day		1	15	22	29
		(1サイクル 42日)		(休薬 13日以上)	

1 パロセトロン点滴静注パック [®] 0.75mg/50 デキサート注射液 6.6mg	50 mL 1 瓶	点滴注射 15分	(1) (15) (29)
2 生理食塩液テルモ 250 mL レボホリナート点滴静注用 () mg (200mg/m ²)	250 mL	点滴注射 120分 オキサリプラチンと同時に滴下 側管	(1) (15) (29)
3 ブドウ糖液5% (250 mL) オキサリプラチン点滴静注液 () mg (85mg/m ²)	250 mL	点滴注射 120分 レボホリナートと同時に滴下	(1) (15) (29)
4 フルオロウラシル注 () mg (400mg/m ²) 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 全開 1-LV, L-OHP同時滴下終了後	(1) (15) (29)
5 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フルオロウラシルフラッシュ用	(1) (15) (29)
6 生理食塩液テルモ 250 mL トラスツズマブBS点滴静注用 () mg (8mg/kg) 注射用水 20 mL	250 mL 20 mL	点滴注射 90分 60mg : 注射用水3.0mLで溶解 150mg : 注射用水7.2mLで溶解	(1)
7 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 トラスツズマブフラッシュ用	

8	フルオロウラシル注 生理食塩液 50 mL	() mg (2400mg/ml) 50 mL	中心静脈注射・精密持続 インフューザー使用 46時間 生食希釈量早見表参照	(1)
9	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ用	(1) (15) (29)
10	生理食塩液テルモ 250 mL トラスツズマブBS点滴静注用 注射用水 20 mL	250 mL () mg (6mg/kg) 20 mL	点滴注射 30分 60mg : 注射用水3.0mLで溶解 150mg : 注射用水7.2mLで溶解	(22)
11	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 トラスツズマブフラッシュ用	(22)