

化学療法スケジュール表

-
- 一般治療
-
-
- 臨床試験
-
-
- 治験

患者氏名
 患者ID
 生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

パブロリスマブ + FP (80-800) インフューザ-使用
 (登録No. 23GI07)

病名	推奨度
食道癌	B

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	／
Pembrolizumab (200mg)		↓
CDDP (80mg/m ²)		↓
5-FU (4000mg/m ²)		↓
Day	1	
(1サイクル 21 日) (休薬 20 日以上)		

総コース数：6コース ショートハイドレーション 十分な経口補液

1 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ 全開	(1)
2 生理食塩液 100 mL キイトルーダ点滴静注 (200) mg	100 mL (200) mg	点滴注射 30分 希釈後の最終濃度は、 1~10mg/mLとなるように調製 0.2~5μmのインラインフィルターを使用	(1)
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4 パロセトン点滴静注バッグ 0.75mg/50 アロカリス点滴静注235mg デキサート注射液 6.6 mg デキサート注射液 1.65 mg	50 mL 1 瓶 1 瓶 2 A	点滴注射 15分	(1)
5 生理食塩液テルモ 500 mL 硫酸Mg 補正液1mEq/mL 20 mL	500 mL 8 mL	点滴注射 60分	(1)
6 マンニトールS注射液 (300mL)	300 mL	点滴注射 30分	(1)
7 生理食塩液テルモ 500 mL シスプラチン点滴静注 () mg (80mg/m ²)	500 mL () mg (80mg/m ²)	点滴注射 60分 CDDPの輸液量はtotal 500mLと	(1)

			なるように生食を抜いて調製	(1)
8	生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 60分	(1)
9	フルオロウラシル注 () mg (4000mg/m ²) 生理食塩液テルモ 250 mL	0.01 mL	抗悪性腫瘍剤局所持続注入 注入時間 120時間(24時間×5日間) インフューザーポンプLV2使用	(1)