

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

ニボルマブ+FP (80-800) インターサ-使用
(登録No. 23GI08)

病名	推奨度
食道癌	B

施用開始日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	/	/
Nivolumab (240mg)		↓	↓
CDDP (80mg/m ²)		↓	
5-FU (4000mg/m ²)		↓	
Day		1	15
(1サイクル 28 日) (休薬 13 日以上)			

ショートハイドレーション 十分な経口補液

1 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ 全開	(1) (15)
2 生理食塩液 100 mL オプジーボ点滴静注 (240) mg	100 mL	点滴注射 30分 希釈後の最終濃度が0.35mg/mL以上 となるように調製 0.2~0.22μmのインラインフィルターを使用	(1) (15)
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4 パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50 アロカリス点滴静注235mg デキサート注射液6.6mg デキサート注射液1.65mg	50 mL 1 瓶 1 瓶 2 A	点滴注射 15分	(1)
5 生理食塩液テルモ 500 mL 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20 mL	500 mL 8 mL	点滴注射 60分	(1)
6 マンニトールS注射液 (300mL)	300 mL	点滴注射 30分	(1)
7 生理食塩液テルモ 500 mL シスプラチン点滴静注 () mg (80mg/m ²)	500 mL	点滴注射 60分 CDDPの輸液量はtotal 500mLと	

			なるように生食を抜いて調製	(1)
8	生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 60分	(1)
9	フルオロウラシル注 () mg (4000mg/ml) 生理食塩液テルモ 250 mL	0.01 mL	抗悪性腫瘍剤局所持続注入 注入時間 120時間(24時間×5日間) インフューザーポンプLV2使用	(1)