

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

エプコリタマブ (1コース目)
(登録No. 23HT13)

病名	推奨度
悪性リンパ腫	C

施用開始日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

epcoritamab (0.16mg)	↓	1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
epcoritamab (0.8mg)						↓					
epcoritamab (48mg)										↓	
epcoritamab (48mg)				↓							
		Day	17	18	22	23	24	25			
		予定日付	/ / / / / / / / / /								
		Day	/ / / / / / / / / /								
			(1サイクル 28 日) (休薬 3 日以上)								

サイトカイン症候群注意要 トシリズマブ準備要

1 エプキンリ皮下注4mg 生理食塩液 20mL	(0.16) mg 20 mL	皮下注射	(1)
2 エプキンリ皮下注4mg 生理食塩液 20mL	(0.8) mg 20 mL	皮下注射	(8)
3 エプキンリ皮下注48mg	(48) mg	皮下注射	(15) (22)
4 プレドニン錠 5mg ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「 アセトアミノフェン錠500mg「マ	100 mg 1 錠 2 錠	内服 エプキンリ投与30~120分前に内服	
5 プレドニン錠 5mg	100 mg	内服 1日2回 朝昼食後 朝12錠、昼8錠	