

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者 I D
生年月日

| | | | |
|------|----------------|-----|---|
| 身長 | cm | 診療科 | |
| 体重 | kg | | |
| 体表面積 | m ² | | |
| Scr | mg/dL | 医師 | 印 |
| Ccr | ml/min | | |

エプコリタマブ (2,3コース目)
(登録No. 23HT14)

| 病名 | 推奨度 |
|--------|-----|
| 悪性リンパ腫 | C |

施用開始日 _____ 年 _____ 月 _____ 日
(初回・継続 _____ コース目・変更)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| epcoritamab (48mg) | 予定日付 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 |
| epcoritamab (48mg) | 予定日付 | / | / | / | / | / | / | | | | |
| | Day | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |

(1サイクル 28 日) (休薬 3 日以上)

サイトカイン症候群注意要 トシリズマブ準備要

| | | | |
|----------------|----------|---|-------------------|
| 1 エプキンリ皮下注48mg | (48) mg | 皮下注射 | (1) (8) (15) (22) |
| 2 プレドニン錠 5 mg | 100 mg | 内服 エプキンリ投与30~120分前に内服 | |
| 3 プレドニン錠 5 mg | 100 mg | 内服 1日2回 朝昼食後 朝12錠、昼8錠 PSL内服の対象は、前回投与後に G2または3のサイトカイン放出症候群が あらわれた患者 投与後にG2以上のサイトカイン放出症候群が あらわれなくなるまで投与を行う | |