

# 化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名  
患者ID  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

**エプコリタマブ (10コース目以降)**  
(登録No. 23HT16)

病名	推奨度
悪性リンパ腫	C

施用開始日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日  
(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

epcoritamab (48mg)	予定日付	/	/	/	/
	↓				
	Day	1	2	3	4

(1サイクル 28 日) (休薬 24 日以上)

**サイトカイン症候群注意要 トシリズマブ準備要**

1 エプキンリ皮下注48mg	( 48) mg	皮下注射	(1)
2 プレドニン錠 5 mg	100 mg	内服 エプキンリ投与30~120分前に内服	
3 プレドニン錠 5 mg	100 mg	内服 1日2回 朝昼食後 朝12錠、昼8錠 PSL内服の対象は、前回投与後にG2または3のサイトカイン放出症候群があらわれた患者 投与後にG2以上のサイトカイン放出症候群があらわれなくなるまで投与を行う	