

## 化学療法スケジュール表

- 
- 一般治療
- 
- 
- 臨床試験
- 
- 
- 治験

患者氏名  
患者ID  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

**NAC ニボルマブ+CBDCA/Pem**  
(登録No. 23LU02)

病名	推奨度
非小細胞肺癌	B

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/
Nivolumab (360mg)	↓			
Pem (500mg/m <sup>2</sup> )	↓			
CBDCA (6×(G+25))	↓			
Day	1	2	3	
	(1サイクル 21 日) (休薬 18 日以上)			

総コース：3コース

1 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ用	(1)
2 生理食塩液 100mL オプジーボ点滴静注	100 mL ( 360) mg	点滴注射 30分 0.2-0.22μmのインラインフィルター使用	(1)
3 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4 パロピト点静注バッグ0.75mg/50 デキサート注射液1.65mg	50 mL 2 A	点滴注射 15分	(1)
5 生理食塩液 100mL ペトリキト点滴静注液「NK」	100 mL ( ) mg (500mg/m <sup>2</sup> )	点滴注射 10分	(1)
6 ブドウ糖液5% (250mL) カルボプラチン点滴静注液	250 mL ( ) mg (6×(G+25))	点滴注射 60分	(1)
7 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
8 アプレピタントカプセル125mg「N」	1 c p	内服 day1 点滴開始時	
9 アプレピタントカプセル80mg「NK」	1 c p	内服	

23LU02 <次ページ有>

受付日 年 月 日

day2, 3 朝食後

パンビタン末 1g 内服 分1 朝食後 7日前より連日内服  
メチコバル注射液500 $\mu$ g 2A 筋肉内注射 7日前より9週毎投与

\*Pemによる皮疹が出現した場合、次コースより投与前日から投与翌日までデカドロン8mg/日  
予防投与を行う