

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²	医師	印
Scr	mg/dL		
Ccr	ml/min		

デュバルマブ + トレリムマブ + CBDCA/Pem
(登録No. 23LU07)

病名	推奨度
非小細胞肺癌	B

施用開始日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	/
Tremelimumab (75mg)		↓
Durvalmab (1500mg)		↓
Pem (500mg/m ²)		↓
CBDCA (5×(G+25))		↓
	Day	1
(1サイクル 21 日) (休薬 20 日以上)		

扁平上皮癌を除く 総コース数：4コース

1	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ用	(1)
2	生理食塩液 100 mL イジユド点滴静注25mg	100 mL (75) mg	点滴注射 60分 希釈後の最終濃度は 0.1~10mg/mLになるように調製 0.2または0.22 μmのインラインフィルターを使用	(1)
3	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4	生理食塩液 100 mL イミフィンジ点滴静注	100 mL (1500) mg	点滴注射 60分 0.2または0.22 μmのインラインフィルターを使用 体重30kg以下は20mg/kgで投与	(1)
5	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
6	パロセトロン点滴静注パッグ® 0.75mg/50 デキサート注射液 1.65 mg	50 mL 2 A	点滴注射 15分	(1)
7	生理食塩液 100 mL ペトレキト®点滴静注液「NK」	100 mL () mg (500mg/m ²)	点滴注射 10分	(1)

8	ブドウ糖液5% (250 mL) カルボプラチン点滴静注液 () mg (5×(G+25))	250 mL	点滴注射 60分 CBDCA : AUC 5-6	(1)
9	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
10	アプレピタントカプセル125mg 「N	1 c p	内服 day1 点滴開始時	
11	アプレピタントカプセル80mg 「NK	1 c p	内服 day2,3 朝食後	
	パンピタン末	1g	内服 分1 朝食後 7日前より連日内服	
	メチコバル注射液500 μg	2A	筋肉内注射 7日前より9週毎投与	
<p>* Pem による皮疹が出現した場合、次コースより投与前日から投与翌日までデカドロン 8mg/日 予防投与を行う</p>				