

# 化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名  
患者ID  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

## デュルバルマブ+ トレメリムマブ5回目

(登録No. 23LU08)


病名	推奨度
非小細胞肺癌	B

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

	予定日付	/
Tremelimumab (75mg)		↓
Durvalmab (1500mg)		↓
	Day	1
(1サイクル 28日) (休業 27日以上)		

1	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 全開 ルートキープ用	(1)
2	生理食塩液 100 mL イジユド点滴静注25mg	( 100 mL 75) mg	点滴注射 60分 希釈後の最終濃度は 0.1~10mg/mLになるように調製 0.2または0.22 μmのインラインフィルターを使用	(1)
3	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4	生理食塩液 100 mL イミフィンジ点滴静注	( 100 mL 1500) mg	点滴注射 60分 0.2または0.22 μmのインラインフィルターを使用 体重30kg以下は20mg/kgで投与	(1)
5	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)



### 白金製剤併用化学療法

- 非扁平上皮型**
    - ・バクリタキセル(アルブミン懸濁型)
    - ・カルボプラチン
    - ・ペムトレキセド+カルボプラチン/シスプラチン
  - 扁平上皮型**
    - ・バクリタキセル(アルブミン懸濁型)
    - ・カルボプラチン
    - ・ゲムシタピン+カルボプラチン/シスプラチン
- 併用療法期 3週間間隔

**4サイクル投与**

ペムトレキセド投与後に病勢が進行していない患者は、ペムトレキセド(500mg/m<sup>2</sup>)維持療法(4週間間隔投与)に移行