

## 化学療法スケジュール表

- 一般治療  
 臨床試験  
 治験

患者氏名

患者ID

生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

**EBV-HLH15 IR/HR3, 4週目**  
(登録No. 23PE02)

病名	推奨度
血球貪食性リンパ組織球症	C

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

VP-16	(150mg/m <sup>2</sup> )	予定日付	/	/
		Day	↓	↓
			1	8
(1サイクル 14 日) (休薬 6 日以上)				

1	グラネトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL ( ) 袋 (0.04袋/kg)	点滴中心静脈 メイン側	
		30分	
		10時30分	メイン側管 メイン同時 (1) (8)
2	生理食塩液テルモ 500mL	点滴中心静脈 メイン側	
	ベプシド注 100mg ( ) mg (150mg/m <sup>2</sup> )	120分	
		11時	メイン側管 メイン止め
			0.4mg/mL以下になるように調製 (1) (8)
3	生理食塩液 50mL	点滴中心静脈 メイン側	
		ベプシドフラッシュ用	(1) (8)