

化学療法スケジュール表

-
- 一般治療
-
-
- 臨床試験
-
-
- 治験

患者氏名
患者 I D
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²	医師	印
S c r	mg/dL		
C c r	ml/min		

サシツズマブ ゴビテカン
(登録No. 24BR03)

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

病名	推奨度
乳癌	B

予定日付 / /
Day 1 8

(1サイクル 21 日) (休薬 13 日以上)

1 生理食塩液 100 mL デキサート注射液 6.6 mg デキサート注射液 1.65 mg ファモチゾン注射液 20mg 「トワ」 ポララミン注 5 mg	100 mL 1 瓶 2 A 1 A 1 A	点滴注射 15分	(1) (8)
2 パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50	50 mL	点滴注射 30分	(1) (8)
3 大塚生食注 (250mL袋) トロデルビ点滴静注用 200mg () mg (10mg/kg)	250 mL	点滴注射 180分 初回投与忍容性良好なら 2回目の投与は120分可 2回目投与忍容性良好なら 3回目以降の投与は60分可 遮光して投与 希釈後の最終濃度が1.1~3.4mg/mL となるように調製 体重80kgを超える場合、 希釈の生食を500mLへ変更 体重30kg未満の場合、 希釈の生食を100mLへ変更	(1) (8)
4 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用 トロデルビ投与時と同じ速度でフラッシュ	(1) (8)
5 アセトアミノフェン錠 500mg 「マ	1 錠	内服 day1, 8 点滴開始前	
6 アプレピタントカプセル 125mg 「N	1 c p	内服	

day1, 8 点滴開始時

7 アプレピタントカプセル80mg 「NK 1 c p

内服

day2, 3, 9, 10 朝食後

8 デカドロン錠4mg 8 m g

内服

day2-4, 9-11 朝昼食後