

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

ペムブロリズマブ+CapOX
(登録No. 24GI02)

病名	推奨度
胃癌	B

施用開始日 年 月 日
(初回・継続 _____ コース目・変更)

Pembrolizumab (200mg)	↓	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1-OHP (130mg/m ²)	↓									
Capo (2000mg/m ²)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Capo (2000mg/m ²)	↓	↓	↓	↓						
Day	11	12	13	14						

(1サイクル 21日) (休薬 7日以上)

1 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ	(1)
2 生理食塩液 100mL キイトルーダ点滴静注 ()	100 mL 200) mg	点滴注射 30分 0.2-5μmのインラインフィルター使用 希釈後の濃度1-10mg/mLになるよう調製	(1)
3 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4 パロセトロン点滴静注ハック® 0.75mg/50 デキサート注射液 6.6mg	50 mL 1 瓶	点滴注射 15分	(1)
5 ブドウ糖液5% (250mL) オキサリプラチン点滴静注 ()	250 mL) mg (130mg/m ²)	点滴注射 120分	(1)
6 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
7 カペシタビン錠300mg「ヤクルト ()) mg (2000mg/m ²)	内服 朝夕食後 カペシタビンの投与量は以下の通り 1.36m ² 未満：1200mg/回 1.36m ² 以上1.66m ² 未満：1500mg/回	

1. 66m²以上1. 96m²未満 : 1800mg/回

1. 96m²以上 : 2100mg/回