

## 化学療法スケジュール表

- 
- 一般治療
- 
- 
- 臨床試験
- 
- 
- 治験

患者氏名  
患者ID  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

ゾルベツキシマブ（初回）+mFOLFOX6（インフューザ-使用）  
（登録No. 24GI04）

病名	推奨度
胃癌	B

施用開始日 年 月 日

（初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更）

	予定日付	／
Zolbetuximab (800mg/m <sup>2</sup> )		↓
1-LV (200mg/m <sup>2</sup> )		↓
1-OHP (85mg/m <sup>2</sup> )		↓
5-FU (400mg/m <sup>2</sup> )		↓
5-FU (2400mg/m <sup>2</sup> )		↓
Day	1	
(1サイクル 14 日) (休薬 13 日以上)		

1 パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50 デキサート注射液 6.6mg デキサート注射液 1.65mg	50 mL 1 瓶 2 A	点滴注射 15分	(1)
2 生理食塩液-F C 1000 mL ピロイ点滴静注用100mg ( ) mg (800mg/m <sup>2</sup> ) 注射用水 P L 100 mL	1000 mL ( ) mL 100 mL	点滴注射 インラインフィルター使用 希釈後の濃度2.0mg/mL 注射用水5mL/Vで溶解 投与速度表参照	(1)
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4 生理食塩液テルモ 250 mL レボホリナート点滴静注用 ( ) mg (200mg/m <sup>2</sup> )	250 mL ( ) mL	点滴注射 120分 オキサリプラチンと同時滴下 側管	(1)
5 ブドウ糖液5% (250 mL) オキサリプラチン点滴静注液 ( ) mg (85mg/m <sup>2</sup> )	250 mL ( ) mL	点滴注射 120分 レボホリナートと同時滴下	(1)
6 フルオロウラシル注 ( ) mg (400mg/m <sup>2</sup> ) 生理食塩液 50 mL	( ) mL 50 mL	点滴注射 全開 1-LV, L-OHP同時滴下終了後	(1)
7 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射	

			フラッシュ用	(1)
8 フルオロウラシル注 生理食塩液 50 mL	( ) mg (2400mg/nl) 50 mL		中心静脈注射・精密持続 インフューザー使用 46時間 生食希釈量早見表参照	(1)
9 アプレピタントカプセル125mg 「N	1 c p		内服 点滴開始前 day1	
10 アプレピタントカプセル80mg 「NK	1 c p		内服 朝食後 day2-3	
11 デカドロン錠4mg	8 mg		内服 朝昼食後 day2-3	
12 オランザピンOD錠 5mg 「トーフ」	1		内服 夕食後 day1-4 DM禁忌	