

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

ゾルベツキシマブ (2回目以降) + mFOLFOX6 (インフューザ)
(登録No. 24GI05)

病名	推奨度
胃癌	B

施用開始日 年 月 日
(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	／
Zolbetuximab	(400mg / m ²)	↓
1-LV	(200mg / m ²)	↓
1-OHP	(85mg / m ²)	↓
5-FU	(400mg / m ²)	↓
5-FU	(2400mg / m ²)	↓
Day	1	
(1サイクル 14 日) (休薬 13 日以上)		

1	パロセトン点滴静注パック 0.75mg/50 デキサート注射液 6.6mg デキサート注射液 1.65mg	50 mL 1 瓶 2 A	点滴注射 15分	(1)
2	生理食塩液テルモ 500 mL ピロイ点滴静注用100mg () mg (400mg / m ²) 注射用水PL 100 mL	500 mL () mL 100 mL	点滴注射 インラインフィルター使用 希釈後の濃度2.0mg/mL 注射用水5mL/Vで溶解 投与速度表参照	(1)
3	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4	生理食塩液テルモ 250 mL レボホリナート点滴静注用 () mg (200mg / m ²)	250 mL () mL	点滴注射 120分 オキサリプラチンと同時滴下 側管	(1)
5	ブドウ糖液5% (250 mL) オキサリプラチン点滴静注液 () mg (85mg / m ²)	250 mL () mL	点滴注射 120分 レボホリナートと同時滴下	(1)
6	フルオロウラシル注 () mg (400mg / m ²) 生理食塩液 50 mL	() mL 50 mL	点滴注射 全開 1-LV, L-OHP同時滴下終了後	(1)
7	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射	

			フラッシュ用	(1)
8	フルオロウラシル注 生理食塩液 50 mL	() mg (2400mg/m ²) 50 mL	中心静脈注射・精密持続 インフューザー使用 46時間 生食希釈量早見表参照	(1)
9	アプレピタントカプセル125mg 「N	1 c p	内服 点滴開始前 day1	
10	アプレピタントカプセル80mg 「NK	1 c p	内服 朝食後 day2-3	
11	デカドロン錠4mg	8 mg	内服 朝昼食後 day2-3	
12	オランザピンOD錠 5mg 「トーワ」	1	内服 夕食後 day1-4 DM禁忌	