

# 化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名  
患者 I D  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

**NIVO+mFOLFOX6 (食道OXA-REPLACE) (インフューザ)**  
(登録No. 24GI10)

病名	推奨度
食道癌	B

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

	予定日付	／
Nivolumab (240mg)		↓
1-LV (200mg/m <sup>2</sup> )		↓
1-OHP (85mg/m <sup>2</sup> )		↓
5-FU (400mg/m <sup>2</sup> )		↓
5-FU (2400mg/m <sup>2</sup> )		↓
Day	1	
(1サイクル 14 日) (休薬 13 日以上)		

1 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ 全開	(1)
2 生理食塩液 100 mL オブジーボ点滴静注 (240) mg	100 mL 240 mg	点滴注射 30分 0.2または0.22μmの インラインフィルターを使用	(1)
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4 パロリトロン点滴静注バッグ0.75mg/50 デキサート注射液6.6 mg	50 mL 1 瓶	点滴注射 15分	(1)
5 生理食塩液テルモ 250 mL レボホリナート点滴静注用 ( ) mg (200mg/m <sup>2</sup> )	250 mL ( ) mg	点滴注射 120分 オキサリプラチンと同時滴下 側管	(1)
6 ブドウ糖液5% (250 mL) オキサリプラチン点滴静注液 ( ) mg (85mg/m <sup>2</sup> )	250 mL ( ) mg	点滴注射 120分 オキサリプラチンと同時滴下	(1)
7 フルオロウラシル注 ( ) mg (400mg/m <sup>2</sup> ) 生理食塩液 50 mL	( ) mg 50 mL	点滴注射 全開 1-LV, L-OHP同時滴下終了後	

8 生理食塩液 50 mL

50 mL

点滴注射  
フラッシュ用

(1)

9 フルオロウラシル注  
生理食塩液 50 mL

( ) mg (2400mg/m<sup>2</sup>)  
50 mL

中心静脈注射・精密持続  
インフューザー使用 4 6時間  
生食希釈量早見表参照

(1)

(1)