

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

ゾルベツキシマブ (2回目以降)+SOX (JACCRO GC-12)
(登録No. 24GI13)

病名	推奨度
胃癌	C

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Zolbetuximab (600mg/m ²)	↓										
1-OHP (130mg/m ²)	↓										
S-1 (80mg/m ²)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	予定日付	/	/	/	/						
S-1 (80mg/m ²)	↓	↓	↓	↓							
	Day	11	12	13	14						
(1サイクル 21日) (休薬 7日以上)											

オキサリプラチンの投与回数は原則最大8回まで

1	パロセトン点滴静注バッグ 0.75mg/50 アロカリス点滴静注235mg デキサート注射液 6.6mg デキサート注射液 1.65mg	50 mL 1 瓶 1 瓶 2 A	点滴注射 30分	(1)
2	生理食塩液テルモ 500mL ビロイ点滴静注用100mg 注射用水PL 100mL	500 mL () mg (600mg/m ²) 100 mL	点滴注射 インラインフィルター使用 希釈後、6時間以内に投与完了 希釈後の濃度2.0mg/mL 注射用水5mL/Vで溶解 投与速度表参照	(1)
3	生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4	ブドウ糖液5% (250mL) オキサリプラチン点滴静注液	250 mL () mg (130mg/m ²)	点滴注射 120分	(1)
5	生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
6	エスワンタイホウ配合OD錠	() mg (80mg/m ²)	内服 朝夕食後 day1-14	

エスラの投与量は以下の通り

1. 25㎡未満：40mg/回

1. 25㎡以上1. 5㎡未満：50mg/回

1. 5㎡以上：60mg/回

7 デカドロン錠4mg

8 m g

内服

朝食後 day2-3

8 オランザピンOD錠 5 mg 「トーワ」

1

内服

夕食後 day0-4 DM禁忌