

# 化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名  
患者ID  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

**Cmab (biweekly) + mFOLFOX6 (インフューザ-使用)**  
(登録No. 24GI15)

病名	推奨度
大腸癌	B

施用開始日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

	予定日付	／
Cmab (500mg/m <sup>2</sup> )		↓
1-LV (200mg/m <sup>2</sup> )		↓
1-OHP (85mg/m <sup>2</sup> )		↓
5-FU (400mg/m <sup>2</sup> )		↓
5-FU (2400mg/m <sup>2</sup> )		↓
	Day	1
(1サイクル 14 日) (休薬 13 日以上)		

**EGFR陽性KRAS野生型**

1 生理食塩液 100 mL	100 mL	点滴注射	
デキサート注射液 6.6 mg	1 瓶	15分	
ポララミン注 5 mg	1 A		(1)
2 大塚生食注 (250mL袋)	250 mL	点滴注射	
アービタックス注射液 100 mg ( ) mg (500mg/m <sup>2</sup> )		120分	
		Total 250mLに調製	(1)
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射	
		フラッシュ用	
		アービタックス投与時と同じ速度でフラッシュ	(1)
4 パロセトン点滴静注パック 0.75mg/50	50 mL	点滴注射	
		15分	(1)
5 大塚生食注 (250mL袋)	250 mL	点滴注射	
レボホリナート点滴静注用 ( ) mg (200mg/m <sup>2</sup> )		120分	
		オキサリプラチンと同時滴下	
		側管	(1)
6 ブドウ糖液 5% (250 mL)	250 mL	点滴注射	
オキサリプラチン点滴静注液 ( ) mg (85mg/m <sup>2</sup> )		120分	
		レボホリナートと同時滴下	(1)
7 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射	

フルオロウラシル注	( ) m g (400m g/m <sup>2</sup> )	1-LV, L-OHP同時滴下終了後 全開	(1)
8 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
9 フルオロウラシル注 生理食塩液 50 mL	( ) m g (2400m g/m <sup>2</sup> ) 50 mL	中心静脈注射・精密持続 インフューザー使用 4 6時間 生食希釈量早見表参照	(1)