

# 化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名  
患者 I D  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

**Ven + AZA (静注)**  
(登録No. 24HT12)

病名	推奨度
多発性骨髄腫	B

施用開始日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
AZA (75mg/m <sup>2</sup> )		↓	↓	↓	↓	↓	↓				
ベネレクタ100 (100mg)		↓									
ベネレクタ100 (200mg)			↓								
ベネレクタ100 (400mg)				↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ベネレクタ100 (400mg)		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
	Day	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/		
ベネレクタ100 (400mg)		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓			
	Day	21	22	23	24	25	26	27	28		
(1サイクル 28 日) (休薬 日以上)											

1 ソルデム3A輸液 500mL	500 mL	点滴注射 ルートキープ 10時～翌10時	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2 パロセトン点滴静注バッグ 0.75mg/50	50 mL	点滴注射 全開 側管	(1) (5)
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ 側管	(2) (3) (4) (6) (7)
4 生理食塩液 100 mL アザシチジン注射用100mg「サワ」 注射用水 20 mL	100 mL ( ) mg (75mg/m <sup>2</sup> ) 10 mL	点滴注射 10分 側管 滴下にはポンプを使用 注射用水4mL/1Vで皮下注へ変更可	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
5 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
6 ソルデム3A輸液 500mL	500 mL	点滴注射	

メイロン静注8.4% 20mL	1 A	180分 側管 補液追加あり	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
7 ベネクレクタ錠100mg	( 100) m g	内服 day1 ★CYP阻害薬併用時のVen用量 ●中等度のCYP3A4阻害剤 (フルコナゾールなど) 用量漸増時、維持投与期 ともに 半量以下に減量 ●強いCYP3A4阻害剤 (イトラコナゾールなど) 用量漸増時 : 1日目は10mg、 2日目は20mg、3日目は50mgに減量 維持投与期 : 50mgに減量	
8 ベネクレクタ錠100mg	( 200) m g	内服 day2	
9 ベネクレクタ錠100mg	( 400) m g	内服 day3-	