

# 化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名  
患者ID  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

**CBDCA/Pem + オシメルチニブ**  
(登録No. 24LU01)

病名	推奨度
非小細胞肺癌	B

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

Pem	(500mg/m <sup>2</sup> )	↓
CBDCA	(5×(G+25))	↓
Osimerutinib	(1錠)	↓
	Day	1
(1サイクル 21 日) (休薬 20 日以上)		

総コース数：4コース 4コース終了後はPem + オシメルチニブ維持療法へ移行

1	パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50 デキサート注射液 1.65mg	50 mL 2 A	点滴注射 15分	(1)
2	生理食塩液 100mL ペメトレキド点滴静注液「NK」 ( ) mg (500mg/m <sup>2</sup> )	100 mL	点滴注射 10分	(1)
3	ブドウ糖液5% (250mL) カルボプラチン点滴静注液 ( ) mg (5×(G+25))	250 mL	点滴注射 60分	(1)
4	生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
5	タグリツソ錠80mg ( ) 錠	1) 錠	内服 1日1回1錠 連日内服	
6	アプレピタントカプセル125mg「N」	1 cp	内服 day1 点滴開始時	
7	アプレピタントカプセル80mg「NK」	1 cp	内服 day2,3 朝食後	
	パンピタン末	1g	内服 分1 朝食後 7日前より連日内服	
	メチコバル注射液 500μg	2A	筋肉内注射 7日前より9週毎投与	
* Pem による皮疹が出現した場合、次コースより投与前日から投与翌日までデカドロン 8mg/日 予防投与を行う				