

# 化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名  
患者ID  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

**Pem + オシメルチニブ (維持)**  
(登録No. 24LU02)

病名	推奨度
非小細胞肺癌	B

施用開始日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

Pem	(500mg/m <sup>2</sup> )	予定日付 /	↓
Osimerutinib	(1錠)	Day	↓
			1
(1サイクル 21 日) (休薬 20 日以上)			

**CBDCA/Pem + オシメルチニブ 4コース終了後の維持療法**

1 生理食塩液 100mL	100 mL	点滴注射	
デキサート注射液6.6mg	1 瓶	15分	(1)
2 生理食塩液 100mL	100 mL	点滴注射	
ペムレキチン点滴静注液「NK」 ( ) mg (500mg/m <sup>2</sup> )		10分	(1)
3 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4 タグリッソ錠80mg	( 1) 錠	内服 1日1回1錠 連日内服	
バンビタン末	1g	内服 分1 朝食後 7日前より連日内服	
メチコパール注射液500μg	2A	筋肉内注射 7日前より9週毎投与	

\*Pem による皮疹が出現した場合、次コースより投与前日から投与翌日までデカドロン 8mg/日 予防投与を行う