

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者 I D
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
S c r	mg/dL	医 師	印
C c r	ml/min		

High dose MTX (3.5g/m²)
(登録No. 24NE01)

病 名	推奨度
悪性リンパ腫	C

施用開始日 _____ 年 _____ 月 _____ 日
(初回・継続 _____ コース目・変更)

MTX	(3500mg/m ²)	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	
		Day	↓	1	2	3	4	5	6	7	8
				(1サイクル 14 日) (休薬 6 日以上)							

脳原発悪性リンパ腫 MTX : 3.5g/m² メソトレキセート発注要

1 ソルデム3A輸液 500mL	500 mL	点滴注射	10:00~翌10:00	(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
2 グラセトン点滴静注バッグ 1mg/50mL	1 袋	点滴注射	朝 全開	(1)
3 生理食塩液 100mL ダイアモックス注射用 500mg	100 mL 1 瓶	点滴注射	朝 全開	(1)(2)(3)
4 ブドウ糖液 5% (500mL) メソトレキセート注射用 () mg (3500mg/m ²)	500 mL	点滴注射	180分 MTX:3.5g/m ² 11:00~14:00 total 500mLとなるように調製	(1)
5 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射	フラッシュ用	(1)
6 グラセトン点滴静注バッグ 1mg/50mL	1 袋	点滴注射	夕 全開	(1)
7 生理食塩液 100mL ダイアモックス注射用 500mg	100 mL 1 瓶	点滴注射	夕 全開	(1)(2)(3)
8 ソルデム3A輸液 500mL メイロン静注 8.4% 20mL	500 mL 1 A	点滴注射	180分 補液追加あり	(1)(2)(3)
9 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射		

アイソボリン点滴静注用25mg

7.5 m g

全開

MTX終了24hr後(day2 14:00)より
6時間毎(2° 8° 14° 20°)に投与
MTXの血中濃度が0.1 μ M以下に
なるまで投与継続する

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)